



Descripció de la varietat

Varietat molt nomenada al final del segle XIX i principi del XX. Quasi extingida, es recuperà al final dels anys noranta. Actualment hi ha al mercat un clon de malvasia de Banyalbufar lliure de virus (IB31).

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	No rivetada
Pèls tombats	Nuls o molt escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Forta

Fulla jove

Color del feix	Vermell rogenc clar
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Forta

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

Circells

Llargària	Llargos
-----------	---------

Fulla adulta

Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Set
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Llarga
Relació llargària/amplada de les dents	Gran
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Moderadament més llarga

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm

Mida del raïm	Mitjana
---------------	---------

Compacitat	Solta
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	El·lipsoide ampla
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Un altre gust
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Primerenca

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	1,37
Nombre de raïms	10,67
Pes del raïm (g)	129,21
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	6,2
Alcohol potencial	16,2
Potencial aromàtic	Alta
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca