



Descripció de la varietat

Actualment no es conrea, però encara se'n troben plantes a Sóller, Fornalutx, Pollença i Manacor. Coincideix amb la varietat giró del banc de germoplasma d'El Encín, i se la coneix més aviat amb el nom de mancès a la zona de Son Macià (Manacor). Els estudis genètics semblen indicar que el creuament d'aquesta varietat amb l'escursac va originar la varietat fogoneu.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Vermell rogenc clar
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Petita
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Oberta a la meitat
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Relació L/A de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Mitjans
Llargària del peciol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
---------------------------------------	---------

Densitat/Compacitat	Compacta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

Fenologia

Època del desborrament	Tardana
Època de l'inici del verolat	Mitjana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,63
Nombre de raïms	9,42
Pes del raïm (g)	298,96
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,5
Alcohol potencial	9,8
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca