



Descripció de la varietat

Varietat molt comuna fins a final del segle XIX, però no s'ha trobat en les prospeccions actuals. La que hi ha a la col·lecció prové del banc de germoplasma d'El Encín.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de vinificació

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 199 de 24/11/2022.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat	
Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Rivetada
Pèls tombats	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Mitjana

Fulla jove	
Color del feix	Vermell rogenc clar
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Mitjana

Pàmpol	
Port	Semierecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

Circells	
Llargària	Curts

Fulla adulta	
Mida del limbe	Petita
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm	
Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Curta

Baia	
Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Violeta vermellós fosc
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia	
Època del desborrament	Tardana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques	
Producció (kg)	2,19
Nombre de raïms	7,08
Pes del raïm (g)	327,69
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm	
Acidesa total	4,6
Alcohol potencial	12,2
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Baixa

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca