



### Descripció de la varietat

Actualment és la varietat majoritària més estesa arreu de l'illa de Mallorca, juntament amb la callet. Molt estesa a la zona de Binissalem per raó de l'apreciació que li va atorgar el celler José Luis Ferrer a mitjan segle XX.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

|   |                      |
|---|----------------------|
| Obertura de la punta                      | Completament oberta  |
| Distribució de la pigmentació antociànica | Absent               |
| Pèls tombats                              | Nuls o molt escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil  |

#### Fulla jove

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Color del feix  | Verd                    |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica                | Dèbil                   |

#### Pàmpol

|  |                |
|--|----------------|
| Port                                   | Semiirecte     |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús  | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd           |
| Color de la cara dorsal del nus        | Verd           |
| Color de la cara ventral del nus       | Verd           |

#### Circells

|           |         |
|-----------|---------|
| Llargària | Mitjans |
|-----------|---------|

#### Fulla adulta

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Mida del limbe  | Gran                      |
| Forma del limbe   | Pentagonal                |
| Nombre de lòbuls  | Cinc                      |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar                                   | Oberta a la meitat        |
| Llargària de les dents  | Curta                     |
| Relació llargària/amplada de les dents                                  | Mitjana                   |
| Forma de les dents  | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa       |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers                 | Absent o molt escassos    |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers                   | Absent o molt escassos    |
| Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central              | Igual                     |

#### Flor

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals                        | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus  |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol   | 1,1 a 2 inflorescències   |

#### Raïm

|               |      |
|---------------|------|
| Mida del raïm | Gran |
|---------------|------|

|   |          |
|---|----------|
| Compacitat                                | Compacta |
| Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana  |

### Baia

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Mida de la baia                     | Mitjana             |
| Forma de la baia                    | Globosa             |
| Color de l'epidermis                | Negre blavós        |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa                 | Moderadament ferma  |
| Gust particular                     | Un altre gust       |
| Formació de llavors                 | Ben formades        |

### Fenologia

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Època del desborrament       | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Tardana |

### Aptituds agronòmiques

|                  |        |
|------------------|--------|
| Producció (kg)   | 5,5    |
| Nombre de raïms  | 14,83  |
| Pes del raïm (g) | 332,56 |
| Vigor            | Mitjà  |

### Qualitat del raïm

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Acidesa total           | 4,3     |
| Alcohol potencial       | 13,5    |
| Potencial aromàtic      | Mitjà   |
| Intensitat de coloració | Mitjana |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte                      | Autors  | Títol                                   | Editorial   |
|------------------------------|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.;<br>Luna, J.M.; Bota,<br>J.; Garau, C.;<br>Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient,<br>Agricultura i Pesca |