



Descripció de la varietat

Actualment és la varietat majoritària més estesa arreu de l'illa de Mallorca, juntament amb la callet. Molt estesa a la zona de Binissalem per raó de l'apreciació que li va atorgar el celler José Luis Ferrer a mitjan segle XX.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Absent
Pèls tombats	Nuls o molt escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil

Fulla jove

Color del feix	Verd
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta a la meitat
Llargària de les dents	Curta
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciolar en relació amb la nervadura central	Igual

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm

Mida del raïm	Gran
---------------	------

Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Mitjana

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Un altre gust
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	5,5
Nombre de raïms	14,83
Pes del raïm (g)	332,56
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,3
Alcohol potencial	13,5
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca