



### Descripció de la varietat

L'arbre assoleix un vigor més bé reduït, capçada menuda i de forma arrodonida. Té el fullam majoritàriament de dulles enteres, de marges quasi ondulats, característica varietal, tal com la Bordissot negra que la distingeix de moltes altres. La productivitat és baixa per tant resulta una varietat poc fructífera. Les figues són marcadament abaldufades. Al principi de la maduració tenen un color verdós amb ratlles longitudinals verd fort que en madurar esdevenen vermelloses i al final, negreses, tal com la Bordissot. Increïblement a la vegada tenen a les mateixes branques figons que no tenen ratlles i maduren tal com una Bordissot negra, per acabar de compondre algunes figues ratllades, maduren damunt fusta verda i algunes negres, damunt fusta marró-vermellós, característic de les figueres rimades. Presenten siconis emparellats i no formacions anormals. Són simètriques en la forma i uniformes de dimensions. La pell és mitjana de gruixa, mig aspra, de consistència dura. Es desprenen poc. Són resistents a les pluges, i sovinteja la gota de mel a l'ull. Les fulles, com hem dit, són enteres i trilobades, amb poca pilositat, i amb l'angle peciolar obtús.

### Origen de la varietat

Varietat molt interessant i desconeguda a la que es tengué la sort de descobrir amb en Pere Ginard, a Sant Llorenç des Cardassar a través de l'amo en Pedro Santandreu i Ferrer, gran coneixedor de les figueres dels indrets comarcals, pagès de socarrel i persona amant de tot el món que envolta a l'agreg mallorquí. La figuera està localitzada i conrada a Sant Llorenç des Cardassar, envellida, a la vora d'una paret seca, tota sola, aturonada, dominant tot el vall que l'envolta.

### Usos i coneixements

Consum animal i humà

### Observacions

Aquesta varietat Bordissot negra rimada és originària de Sant Llorenç des Cardassar, on se la coneix com a Verdaleta pintada. Figuera única, plantada segurament com a Bordissot negra, i per mutació o per malaltia, ha esdevingut ratllada, per tal cosa, tots els descriptors de la figuera coincideixen amb la Bordissot i hem gosat anomenar-la com a Bordissot negra rimada; una joia de figuera.

Per les seves característiques organolèptiques es considera una varietat única amb aquestes característiques, probablement sorgida d'una virosis que afecte als cloroplasts, encara en estudi.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Fenologia

Data inici de la brotació	12-18 de març
Distribució de la collita	Figues tardanes
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figaflores	Molt tardana (>1 de juliol)
Plena maduresa de les figues	2 setembre-24 d'octubre
Període de collita (dies)	Llarg (41-60 dies) (38-48 dies)
Data d'abscisió de fulles	20-30 d'octubre

#### Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Reduït
Port	Espargit
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del borró terminal	Cònica
Color del borró terminal	Verd groguenc
Emissió de brots de l'arbre	Escassa
Llargària dels brots (cm)	Curta (< 10 cm) (5-7)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,35)
Color dels brots	Marró ataronjat
Tendència a emetre tanyades	Poca
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

## Fulla

Color de la fulla	Verd fort
Nombre de fulles/brot	5,8
Nombre de lòbuls	Entera (Enteres (70%))
Amplada de la fulla (cm)	14,3
Llargària de la fulla (cm)	15,9
Presència de dents als lòbuls	Presentes
Marges dels lòbuls	Serrat (Poc marcats)
Sinus peciolar	Obtús
Densitat de pèls a l'envers	Escassa
Densitat de pèls al revers	Escassa
Llargària del peciolar (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,9)
Diàmetre del peciolar (mm)	5,6
Secció del peciolar	Redona
Color del peciolar	Verd groguenc

## Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Allargada o el·líptica transversal ( $l < 0,9$ ) (0,88)
Percentatge de siconis emparellats (%)	3
Pes (g)	29,058
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (40)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (45)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostiol (mm)	1-3
Gota a l'ull	Present
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Marró
Color del peduncle del fruit	Verd groguenc
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	4
Formacions anormals (%)	0
Abscisió del peduncle	Difícil
Facilitat de pelada	Mitjana
Costelles	Intermèdies
Clivells	Presentes
Forma dels clivells	Longitudinal (gruixats)
Gruix de l'epidermis (mm)	Mitjà (0,3-0,7) (0,5)
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre vernellós
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Molt petita
Quantitat d'aquenis	Molts
Sabor	Dolç (Saborós)
Consistència del fruit	Forta

## Característiques de les figues seques

Color	Fosc
Període d'assecamment	Mitjà (8-14 dies) (7-14 dies)

## Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	5,67
Rendiment per arbre	Elevat
Resistència al transport	Alta

Resistència a agrit	Mitjana
Resistència a badament	Resistent

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Pons Bocana, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	