



Descripció de la varietat

L'arbre és d'una vigoresitat considerable, amb capçada arrodonida i gran cimada molt atapeïda de fulles de tres i cinc lòbuls, densa de brancatge. Té una productivitat mitjana. La collita és de gran qualitat, i presenta un període de recol·lecció mitjà alt. Les figues són abaldufades. Tenen un color morat pàl·lid atractiu, amb un clivellat reticular molt marcat que va des del coll fins a l'ull i que, en conjunt, la fa una figa molt vistosa. Presenten siconis emparellats en percentatge baix i no tenen formacions anormals. La polpa, molt vermella, té un sabor molt dolç i sucós, més apreciat en estar avançada la maduració. Tenen aquenis en bona quantitat i mitjans de mida. La pell, mitjana de gruixa, és molt fina al tacte, i té un clivellat a l'ull molt característic amb dos, tres o cinc clivells que en surten, gruixats i molt marcats. Presenten una mitjana facilitat de pelada i una abscisió del peduncle també mitjana. Tenen una resistència mitjana a les pluges i poca resistència al badament, de consistència mitjana amb prou sensibilitat al despreniment.

Origen de la varietat

La figuera està localitzada a Ca l'Oro, de Miquel Tomàs i a Can Cantó, veïns a la marina llucmajorera, indrets d'on és originària, no havent-les observades a cap altre indret.

Usos i coneixements

Consum humà

Observacions

Anomenada Bordissot rossa, precisament per la vistosa coloració rossenca de la figa, d'una manera nítida i estilitzada, al cap i a la fi, una figa refinada i elegant.

Varietat única al conreu de les Illes tal com a varietat definida, amb descriptors ben diferenciats

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia

Data inici de la brotació	12-18 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Tardana (15-31 d'agost) (18 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Tardana (1-30 de setembre) (20 agost - 30 setembre)
Període de collita (dies)	Mitjà-Alt (>20 dies)
Data d'abscisió de fulles	2-12 d'octubre

Arbre i ramificació

Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà-Elevat
Port	Espargit
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Densa
Forma del berró terminal	Cònica
Color del berró terminal	Groc verdós
Emissió de brots de l'arbre	Nul·la
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (9,04)
Color dels brots	Verd rogenc
Tendència a emetre tanyades	Nul·la
Presència de bonys nodals	A la soca i les branques

Fulla

Color de la fulla	Verd fort
Nombre de fulles/brot	6,18
Nombre de lòbuls	Enteres, Trilobades i Pentalobades (Trilobades (95%); Enteres i Pentalobades (5%))
Amplada de la fulla (cm)	18,2

Llargària de la fulla (cm)	19,3
Presència de dents als lòbuls	Presentes
Marges dels lòbuls	Serrat (Molt marcats)
Sinus peciolar	Obtús
Densitat de pèls a l'envers	Nombrosa
Densitat de pèls al revers	Nombrosa
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (6,9)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,6
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd

Fruit

Forma segons la situació del diàmetre màxim	Abaldufada
Forma (l= amplada/llargària)	Esclafada o el·líptica longitudinal (l > 1,1) (1,15)
Percentatge de siconis emparellats (%)	3
Pes (g)	37,450
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (45)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (39)
Uniformitat de les dimensions	Uniforme
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	2-5
Gota a l'ull	Absent
Grandària de les esquames	Grossa
Color de les esquames	Rosat
Color del peduncle del fruit	Verd clar
Forma del peduncle	Cilíndric
Llargària del peduncle (mm)	4
Formacions anormals (%)	0
Abscició del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Intermèdies
Clivells	Presentes
Forma dels clivells	Reticular (Molt marcats i vistosos)
Gruix de l'epidermis (mm)	Mitjà (0,3-0,7) (0,5)
Textura de l'epidermis	Molt fina
Color de fons de l'epidermis	Morat pàl·lid
Color de l'albedo	Clar
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Petita
Quantitat d'aquenis	Molts
Mida dels aquenis	Mitjans
Sabor	Molt dolç i saborós
Consistència del fruit	Mitjana

Característiques de les figues seques

Color	Clar
Període d'assecament	Mitjà (8-14 dies)

Caràcters agronòmics

Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,92
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència al transport	Mitjana
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència a badament	Susceptible

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Pons Bocana, M.	Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor)	