



### Descripció de la varietat

També se la coneix amb el nom de premsal blanc. És la varietat autòctona autoritzada majoritària a les Illes Balears. Al final del segle XX es va veure que no hi havia cap varietat blanca representativa; aleshores, els cellerers Armero i Alabern van començar els estudis d'aquesta varietat. La distribució sembla indicar que és originària de Consell, i des d'allà es va estendre a la resta de l'illa.

### Origen de la varietat

Sembla que és originària de Consell.

### Usos i coneixements

Consum humà

Generalment es considera raïm per vinificar.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Absent
Pèls tombats	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil

#### Fulla jove

Color del feix	Verd grogós
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Absent o molt dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiirecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

#### Circells

Llargària	Mitjans
-----------	---------

#### Fulla adulta

Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament oberta
Llargària de les dents	Mitjana
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Igual

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus

Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències
Raïm	
Mida del raïm	Gran
Compacitat	Solta
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga
Baia	
Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Groc
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermeza de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades
Fenologia	
Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana
Aptituds agronòmiques	
Producció (kg)	3,02
Nombre de raïms	9,00
Pes del raïm (g)	347,79
Vigor	Mitjà
Qualitat del raïm	
Acidesa total	5,0
Alcohol potencial	12,1
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca