



Descripció de la varietat

La figuera és d'un desenvolupament mitjà, i el seu vigor entre mitjà i baix, té un brancatge molt clar i deformat, copa allargada de branques penjants. És una varietat que té un període de collita molt curt, doncs només té figues tres setmanes i amb un rendiment productiu mitjà. Les figues són urceolades un poc aperades, mitjanes, simètriques en la forma i uniformes en les dimensions, de color negre obscur, poc clivellades, d'epidermis prima i fina, polpa de color vermell intens, de gust aspre, aquenís mitjans en quantitat i mida. Tenen una difícil abscisió del peduncle i una bona facilitat de pelat, són de consistència blana, que la fa poc apta per al transport, resistència mitjana a les pluges i a l'obertura de l'ostiol. Sensibles a l'agriat i molt susceptible al despreniment. Les fulles es reparteixen entre unilobulades y trilobulades, a parts més o menys iguals, els marges són serrats poc retallats i pilositat escassa al revers, amb un angle peciolar agut. Actualment esta en risc crític d'erosió genètica, i de desaparició del conreu de les Illes.

Origen de la varietat

Localitzada a Randa, terme d'Algaida, a la finca de Son Bernat, datada pels seus familiars avantpassats des de temps immemorial. Aquesta figuera es troba a un centenar de metres de les cases, molt a prop del cementiri de Randa. Molt poc cultivada, en total declivi, un temps se conreava per la zona d'Algaida i voltants, sempre en varietats aïllades.

Usos i coneixements

Consum animal i humà
A causa del seu molt curt període de recol·lecció era molt poc emprada per al consum humà.

Observacions

La varietat Matasoldats és poc cultivada i coneguda, a pesar de que en alguns llocs tenia almenys un arbre plantat com a curiositat. Popularment, el nom es deu a que l'arbre estava plantat junt a un quarter de soldats, i que en època de fam, la tropa es nodria desmesuradament dels seus fruits, provocant des de diarrees fins a disenteria.

Caràcters morfològics de la varietat

Fenologia	
Data inici de la brotació	12-18 de març
Distribució de la collita	Figues agostenques
Inici de la maduració	Mitjana (1-15 d'agost) (7 d'agost)
Plena maduresa de les figues	Mitjana (11-31 d'agost) (14 agost-5 setembre)
Període de collita (dies)	Molt curt (
Data d'abscisió de fulles	15-20 setembre

Arbre i ramificació	
Hàbit de creixement	Obert
Vigor	Mitjà
Port	Espargit
Ramificació	Dominància apical present, desenvolupament lateral present
Densitat de ramificació	Clara
Forma del borro terminal	Cònica
Color del borro terminal	Verd groguenc
Emissió de brots de l'arbre	Nul·la
Llargària dels brots (cm)	Mitjana (11-20 cm) (12,3)
Diàmetre dels brots (mm)	Prim (< 10 mm) (8,52)
Color dels brots	Marró verdós
Tendència a emetre tanyades	Poca
Presència de bonyes nodals	A la soca i les branques

Fulla	
Color de la fulla	Verd Clar
Nombre de fulles/brot	7,16
Nombre de lòbuls	Enteres i trilobades (50% de cada)

Amplada de la fulla (cm)	15,4
Llargària de la fulla (cm)	14,3
Presència de dents als lòbuls	Presentes
Marges dels lòbuls	Serrat (Poc retallats)
Sinus peciolar	Obtús (120-180 graus)
Densitat de pèls a l'envers	Escassa
Llargària del pecíol (cm)	Mitjana (5-8 cm) (7,3)
Diàmetre del pecíol (mm)	5,83
Secció del pecíol	Redona
Color del pecíol	Verd groguenc

Fruit	
Forma segons la situació del diàmetre màxim	Ouada
Forma (l= amplada/llargària)	Globosa o circular (l = 0,9-1,1)
Percentatge de siconis emparellats (%)	0
Pes (g)	32,23
Amplada del fruit (mm)	Mitjana (38-49) (40)
Llargària del fruit (mm)	Curta (29-46) (38)
Uniformitat de les dimensions	Variable
Simetria	Simètric
Diàmetre de l'ostíol (mm)	2-3
Gota a l'ull	Present (Poc sovint)
Grandària de les esquames	Petita
Color de les esquames	Rosat
Color del peduncle del fruit	Vermell obscur
Forma del peduncle	Troncocònic
Llargària del peduncle (mm)	2-3
Formacions anormals (%)	0
Abscisió del peduncle	Fàcil
Facilitat de pelada	Molta
Costelles	Poc marcades
Clivells	Presentes
Forma dels clivells	Reticular (Molt fines i molt marcades)
Gruix de l'epidermis (mm)	Mitjà (0,3-0,7) (0,3-0,5)
Textura de l'epidermis	Mitjana
Color de fons de l'epidermis	Negre lluent
Color de l'albedo	Negre pruïnós
Color de la polpa	Vermell
Cavitat interna	Mitjana-Grossa
Quantitat d'aquenis	Pocs
Sabor	Fat
Consistència del fruit	Blana

Característiques de les figues seques	
Color	Fosc
Període d'asseccament	Mitjà (8-14 dies) (7-14 dies)

Caràcters agronòmics	
Eficiència productiva (núm. fruits/brot)	3,5
Rendiment per arbre	Mitjà
Resistència al transport	Baixa
Resistència a agrit	Susceptible
Resistència a badament	Resistent