



### Descripció de la varietat

Els arbres d'aquesta varietat són de mida discreta, disposen d'una capçana irregular i són de difícil poda de formació. També presenten branques primes, zigzaguejant, proveïdes de moltes pues. La seva floració s'inicia a mitjans de maig, mentre que la maduració comença a tenir lloc per mitjans de setembre.

Les fulles són el·lipsoides, obliqües i obtuses, de color verd lluent i trinervades. El seu capoll és curt i acanalat. El fruit és una drupa ovoide, amb pell llisa de color groc verdós i polpa de color clar, compacta i dolça. Només té un sol pinyol, que acaba en punta als dos extrems.

### Origen de la varietat

Els ginjoler són arbusts de procedència oriental, que pareixen ser estat introduïts per els agricultors àrabs. Segons Plini, el ginjoler va ser introduït a Roma, procedent de Síria, per el Cònsul Sexto Papinio, en el segle I, a finals del regnat de Augusto i proporciona una il·lustració d'un ginjoler cultivat a un hort d'Espanya. (RIVERA ET AL. 1997).

### Usos i coneixements

Consum humà

El seu bon gust queda un poc amagat per una escassa presència del fruit.

### Observacions

HABSBURGO-LORENA, ARXIDUC L.S. 1869-1884: "De ginjoler n'hi ha molt pocs, però se'n troben aïlladament a molts de municipis. Li van bé els terrenys flonjos, protegits dels vents de tramuntana. Se'l reproduïx mitjançant bordalls, estaques i la sembra del pinyol en primavera quan aquests arbres comencen a brostar. Els empelten per l'abril o el maig. La seva fruita (gínjols) la mengen sobretot els infants; pel que fa al preu, se'n pot dir el mateix que de les atzaroles. Se'n fa xarop i confitura de gínjol". Es troben abundants arbres arreu de Mallorca. Els planteristes segueixen comercialitzant plantons d'aquesta varietat. Arbre de referència. Can Pont i Soler de Lloseta.

### Caràcters morfològics de la varietat

| Planta                |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Inici de la floració  | Mitjans de maig     |
| Inici de la maduració | Mitjans de setembre |

| Fulla             |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Longitud (cm)     | 4,61 ± 0,25                  |
| Amplada (cm)      | 2,01 ± 0,13                  |
| Relació L/A       | 2,29                         |
| Forma de la fulla | El·lipsoide                  |
| Color de la fulla | Verd lluent en ambdues cares |

| Fruit                        |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Longitud (cm)                | 3,16 ± 0,26             |
| Amplada (cm)                 | 2,49 ± 0,24             |
| Relació L/A                  | 1,26                    |
| Forma del fruit              | Ovoide                  |
| Posició de la part més ampla | Al centre               |
| Pes (g)                      | 5,86 ± 0,34             |
| Color de la pell             | Groc verdós i vermellós |
| Color de la polpa            | Blanc verdós            |
| Sabor del fruit              | Dolç                    |

| Pinyol                |          |
|-----------------------|----------|
| Terminació de la base | Punxegut |
| Terminació de l'àpex  | Punxegut |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte                      | Autors                            | Títol   | Editorial             |
|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Llibres i altres monografies | Habsburg-Lorena i Borbó, A. L. S. | Die Balearen in Wort und Bild Geschildert. F. Brockhau.<br>Trad. Cast. parcial de Sureda Blanes |                       |
| Llibres i altres monografies | Rivera Núñez, D. et al.           | Variedades tradicionales de frutales de la cuenca del río Segura. Catalogo etnobotánico (I)     | Universidad de Murcia |