



Descripció de la varietat

Els ceps presents a la col·lecció provenen del banc de germoplasma d'El Encín.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove	
Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Presència de pèls tombats a la punta	Mitjans
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Mitjana

Fulla jove	
Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol	
Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells	
Longitud dels circells (cm)	Mitjans

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta	
Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Oberta a la meitat
Relació L/A de les dents	Mitjana
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absència o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Mitjans
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Igual

Raïm	
Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran
Densitat/Compacitat	Compacta

Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta
---	-------

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	3,75
Nombre de raïms	10,08
Pes del raïm (g)	401,22
Vigor	Mitjà

Qualitat del raïm

Acidesa total	4,5
Alcohol potencial	11,9
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca