



Descripció de la varietat

Aquesta varietat pot arribar a agafar mides importants, però no ho sol fer, ja que és sotmesa a podes severes. Té creixements llargs i gruixats, molt verticals, amb una coloració marronosa. És monoica. Amb flors de quatre peces sepaloides. Les masculines amb quatre estams, en espigues denses, més o manco oblongues. Les femenines amb sèpals ciliats i estigmes pubescents. Inicia la floració a mitjans del mes de juny, i madura dins el mes de juliol de manera molt escalonada, pràcticament durant tot el mes.

Les fulles presenten molta variabilitat dins la mateixa planta. Són ovades, agudes, acorades, sencers o un poc dentades o lobulades i gruixades. Solen presentar un color verd intens per l'envers.

Les infructescències són molt grosses, amb molt de pes. El seu color predominant és el vermell fosc, i són molt sucoses i de gust dolç, poc àcid.

Usos i coneixements

Consum humà

Aquesta varietat de mora, ha estat més destinada al consum del fruit, ja que les fulles tenen manco qualitat per a l'alimentació dels cucs de seda.

El fruit gros i sucós té bona qualitat per el consum en fresc. Esporàdicament s'en fan confitures.

La seva fusta és molt apreciada i tradicionalment s'ha destinat a l'elaboració de cadires i també algunes peces de carro.

Observacions

"A Mallorca hi ha quatre classes de moreres, a saber: l'antiga morera corrent, que també s'anomena morera ver o de la gran casta; la morera blanca, que es va plantar sobretot de 1857 a 1863 a causa de la gran indústria del cuc de seda existent en aquella època; la morera amb moltes tiges o multicaula, que es va tractar d'introduir a la mateixa època, i la morera negra amb suc de móreres negre." (HABSBURGO-LORENA, ARXIDUC L.S. 1869-1884). Es troben arbres aïllats arreu de Mallorca, més present a la zona del llevant. També és anomenat morera Vera o de la gran Casta per l'Arxiduc Lluís Salvador.

Caràcters morfològics de la varietat

| Planta | |
|------------------------------|------------------------|
| Inici de la floració | A mitjans de juny |
| Inici de la maduració | Dins el mes de juliol |
| Durada de la collita | Molt escalonada |
| Fulla | |
| Longitud (cm) | 13,6 ± 1,24 |
| Amplada (cm) | 13,59 ± 0,97 |
| Relació L/A | 1 |
| Forma de la fulla | Molt variable |
| Color de la fulla | Verd intens |
| Fruit | |
| Longitud (cm) | 3,86 ± 0,38 |
| Amplada (cm) | 2,22 ± 0,1 |
| Relació L/A | 1,74 |
| Pes (g) | 6,6 ± 1,05 |
| Posició de la part més ampla | Al centre |
| Color de pell | Vermell molt fosc |
| Sabor del fruit | Dolç i sucós, poc àcid |