



### Descripció de la varietat

Varietat introduïda segurament amb les replantacions ocasionades arran de la fil·loxera. Molt comuna al sud de França i parcialment adaptada als sòls mallorquins.

### Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Tancada
Relació L/A de les dents	Mitjana
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

#### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
---------------------------------------	---------

Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Curta

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Gran
Forma de la baia	El·lipsoide ampla
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	3,19
Nombre de raïms	8,03
Pes del raïm (g)	192,23
Vigor	Mitjà

### Qualitat del raïm

Acidesa total	4,4
Alcohol potencial	12,6
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca