



Descripció de la varietat

Varietat de raïm negre. Cep de pàmpols erectes, fulles joves amb certa coloració vermella, que esdevenen verdes quan s'engrandeixen. Tret distintiu de la varietat can March és la fulla adulta, que es diferencia d'altres per presentar tres lòbuls majoritàriament en lloc de cinc. Les baies, de forma globosa, són de color violeta vermellós fosc, tot i que amb una tonalitat que dona lloc a un vi rosat fosc. Forma raïms de grandària i consistència mitjana, ni solta ni compacta. Els pàmpols formen entre una i dues inflorescències, inserides al tercer, quart o fins al cinquè nus. Varietat d'elevada producció, entre 2 i 5 kg per cep. L'esborrament comença a principis d'abril, i el raïm madura a principis de setembre.

Origen de la varietat

Aquesta varietat es va trobar a la finca de Can March en Benimussa, a l'illa d'Eivissa.

Usos i coneixements

Consum humà

Varietat tradicionalment destinada a la producció de vi negre per autoconsum.

Observacions

La varietat can March és una accessió única, només trobada a una finca de Benimussa, can March (que ha donat el nom a la varietat). Es tracta probablement d'una varietat minoritària. S'ha verificat pel Consell d'Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d'una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada amb cap altra varietat.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Molt oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil
Presència de pèls erectes a la punta	Absents o molt escassos

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Molt densos
Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers	Molt Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Absent o molt dèbil

Pàmpol

Port	Erecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans (13)
-----------------------------	--------------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana (20,20 ± 0,83)
-------------------------	-------------------------

Amplada del limbe (cm)	Mitjana (20,40 ± 0,84)
Forma del limbe	Orbicular
Nombre de lòbuls	Tres
Posició dels lòbuls del sinus peciolars	Fortament superposada
Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors	Lleugerament superposada
Relació L/A de les dents	Mitjana
Longitud de les dents (cm)	Mitjana (0,5-1,5)
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antocianica	Baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana (19,05 ± 2,09)
Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Mitjana (6,75 ± 1,11)

Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana (1,67 ± 0,13)
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Violeta vermellós fosc
Pigmentació antocianica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana (Desborrament darrera setmana de març)
Època de l'inici del verolat	Verolat mitjans juliol

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial