



Descripció de la varietat

Varietat molt comuna a les zones de Felanitx i Manacor. Alguns productors la coneixen com a callet blanc.

Usos i coneixements

Consum humà

Vinya de vinificació

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat

| | |
|---|---------------------|
| Obertura de la punta | Completament oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica | No rivetada |
| Pèls tombats | Escassos |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Mitjana |

Fulla jove

| | |
|---|-------------------------|
| Color del feix | Vermell rogenc fosc |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Forta |

Pàmpol

| | |
|--|------------|
| Port | Semiirecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |

Circells

| | |
|-----------|-------|
| Llargària | Curts |
|-----------|-------|

Fulla adulta

| | |
|---|------------------------------------|
| Mida del limbe | Gran |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Cinc |
| Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Oberta a la meitat |
| Llargària de les dents | Llarga |
| Relació llargària/amplada de les dents | Gran |
| Forma de les dents | Un costat còncav, un costat convex |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Absent o molt baixa |
| Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos |
| Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta |

Flor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |

Raïm

| | |
|---------------|---------|
| Mida del raïm | Gran |
| Compacitat | Mitjana |

| | |
|---|---------------------------|
| Llargària del peduncle del raïm principal | Curta |
| Baia | |
| Mida de la baia | Mitjana |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Groc |
| Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Gust particular | Cap |
| Formació de llavors | Ben formades |
| Fenologia | |
| Època del desborrament | Mitjana |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana |
| Aptituds agronòmiques | |
| Producció (kg) | 1,93 |
| Nombre de raïms | 11,08 |
| Pes del raïm (g) | 174,84 |
| Vigor | Mitjà |
| Qualitat del raïm | |
| Acidesa total | 5,6 |
| Alcohol potencial | 12,5 |
| Potencial aromàtic | Mitjà |
| Intensitat de coloració | Mitjana |

Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors | Títol | Editorial |
|------------------------------|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A. | Varietats de vinya de les Illes Balears | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |