



### Descripció de la varietat

La varietat xinxó forma un raïm de grandària considerable i densitat mitjana. Les baies són de color verd, a voltes verd groguenc, i de forma globosa. És suau, de polpa consistent i pell fina. Sol formar dos raïms per pàmpol, i la seva productivitat és prou elevada, entre 4 i 7 kg per cep, tot i que és lleugerament sensible a la botritis i l'oïdi. Madura a mitjan setembre i posseeix un potencial alcohòlic elevat.

### Origen de la varietat

Aquesta varietat ha estat prospectada d'una finca, Can Xinxó, a Sant Josep de sa Talaia, a l'illa d'Eivissa. No hi ha record del conservador. Probablement es tracta d'una vinya minoritària. Actualment és una varietat en desús.

### Usos i coneixements

Consum humà

Varietat destinada a raïm de taula, tot i que es pot fer servir per produir vi blanc.

### Observacions

La varietat xinxó és una accessió única, només trobada a una finca de Sant Josep de sa Talaia, can Xinxó (que ha donat el nom a la varietat). S'ha verificat pel Consell d'Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d'una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada amb cap altra varietat.

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Molt oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil
Presència de pèls erectes a la punta	Absents o molt escassos

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd amb zones antociàniques
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers	Absent o molt dèbil
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Semirecte-horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans (13,87)
-----------------------------	-----------------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran (22 ± 2,16 )
Amplada del limbe (cm)	Ampla (22,40 ± 1,51 )

Forma del limbe	Orbicular
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolars	Fortament superposada
Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors	Lleugerament superposada
Relació L/A de les dents	Petita
Longitud de les dents (cm)	Mitjana (1 ? 1,5 )
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antocianica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciol en relació amb la nervadura central	Igual

### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana (25,0 )
Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Mitjana (8,75 ± 0,35 )

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Petita (1,67 ± 0,16 )
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antocianica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Formació de llavors	Ben formades

### Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Mitjana