



Descripció de la varietat

Varietat eivissenca de raïm rosat. Ceps de port semierecte, amb fulles verdes de només 3 lòbuls i dentició reduïda. Els pàmpols, amb 1 o 2 inflorescències que formen raïms relativament grans, densos i compactes. Les baies, globoses, són d'un color vermell característic. L'època d'esborrament és a finals de març i es cull a principis setembre. El seu potencial alcohòlic és relativament baix.

Origen de la varietat

Localitzada a Can Lluquí, Santa Gertrudis (Eivissa). Es tracta d'una accessió única, no trobada a cap altra finca.

Usos i coneixements

Consum humà

Es desconeix si es consumia en fresc o s'emprava per elaboració de vi rosat.

Observacions

La varietat Lluquina rep el nom de la finca on es va trobar, Can Lluquí de Can Bet, a la parròquia de Santa Gertrudis. A la dècada dels 50, Antonio Torres Torres va fer una selecció de deu o quinze varietats eivissenques de taula i per elaborar vi. Entre elles estava aquesta varietat rosada poc habitual. Va crear una vinya de 2900 ceps de diferents varietats, amb els quals la família elaborava vi per vendre als veïns, que emmagatzemava a un cubell de 8000 litres. Encara hi ha gent a Santa Gertrudis que recorda comprar vi a la finca de Can Lluquí.

S'ha verificat pel Consell d'Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d'una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

| | |
|--|-------------------------|
| Obertura de la punta | Molt oberta |
| Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent |
| Presència de pèls tombats a la punta | Mitjans |
| Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta | Absent o molt dèbil |
| Presència de pèls erectes a la punta | Absents o molt escassos |

Fulla jove

| | |
|--|---------------------|
| Color de l'anvers del limbe (4a fulla) | Verd |
| Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Molt densos |
| Densitat pèls erectes entre les nervadures principals del revers | Absent o molt dèbil |
| Intensitat de la pigmentació antociànica | Absent o molt dèbil |

Pàmpol

| | |
|--|-------------------------|
| Port | Semierecte |
| Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell |
| Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd |
| Color de la cara dorsal del nus | Verd |
| Color de la cara ventral del nus | Verd |
| Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos |

Circells

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Longitud dels circells (cm) | Mitjans (13,6) |
|-----------------------------|----------------|

Flor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat |
| Insecció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus |
| Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències |

Fulla adulta

| | |
|---|---------------------------|
| Longitud del limbe (cm) | Mitjana (19,17 ± 2,11) |
| Amplada del limbe (cm) | Mitjana (19,30 ± 2,00) |
| Forma del limbe | Pentagonal |
| Nombre de lòbuls | Tres |
| Posició dels lòbuls del sinus peciolars | Oberta |
| Disposició dels lòbuls dels sinus laterals superiors | Fortament superposada |
| Relació L/A de les dents | Mitjana |
| Longitud de les dents (cm) | Curta (0,5 ? 0,8) |
| Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis |
| Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antocianica | Alta |
| Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos |
| Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Densos |
| Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central | Més curta |

Raïm

| | |
|---|-------------------------|
| Longitud del raïm sense peduncle (cm) | Mitjana (21,11 ± 2,42) |
| Densitat/Compacitat | Compacta |
| Longitud del peduncle del raïm principal (cm) | Mitjana (4,44 ± 1,36) |

Baia

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Longitud de la baia (cm) | Mitjana (1,74 ± 0,12) |
| Forma de la baia | Globosa |
| Color de l'epidermis | Vermell |
| Pigmentació antocianica de la polpa | Absent o molt dèbil |
| Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma |
| Formació de llavors | Ben formades |

Fenologia

| | |
|------------------------------|--|
| Època del desborrament | Primerenca (Desborrament darrera setmana de març) |
| Època de l'inici del verolat | Mitjana (Verolat a mitjans de juliol) |