



Descripció de la varietat

Varietat de raïm rosat. Ceps de port semierecte, amb pàmpols i fulles vermelloses. Tret diferenciador d'aquesta varietat local és la fulla reniforme i desproveïda completament de pèls (tricomès) al revers del limbe. Sol formar una única inflorescència per pàmpol, inserida a partir del cinquè nus. El raïm és moll, amb baies prou soltes, grans, de color vermell i forma el·lipsoïde ampla. De polpa tova i pell fina, és preuada per la seua qualitat. Floreix a mitjans març i madura entrat setembre.

Origen de la varietat

Trobada a Can Pep Codolar, en Sant Llorenç, a l'illa d'Eivissa. Era varietat habitual per la zona de Sant Llorenç.

Usos i coneixements

Consum humà
No es coneix l'ús tradicional d'aquesta varietat, tot i que sembla adient per raïm de taula.

Observacions

És accessió única. S'ha verificat pel Consell d'Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d'una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat	
Obertura de la punta	Molt oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Absent
Pèls tombats	Escassos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil
Pèls erectes de la punta	Absents o molt escassos

Fulla jove	
Color del feix	Verd
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Molt densos
Pèls erectes sobre les nervadures del limbe	Absent o molt dèbil
Intensitat de la pigmentació antociànica	Absent o molt dèbil

Pàmpol	
Port	Semierecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell
Pèls erectes sobre l'entrenús	Absents o molt escassos

Circells	
Llargària	Mitjans

Fulla adulta	
Mida del limbe	Mitjana
Forma del limbe	Reniforme
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Oberta
Postura dels lòbuls al sinus foliar	Lleugerament superposada
Llargària de les dents	Curta
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Baixa

Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Més curta

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	A partir del cinquè nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm	
Mida del raïm	Mitjana
Compacitat	Compacta
Llargària del peduncle del raïm principal	Llarga

Baia	
Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	El·lipsoide ampla
Color de l'epidermis	Vermell
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia	
Època del desborrament	Primerenca