



### Descripció de la varietat

Amb les prospeccions es va localitzar a les zones de Porreres i Montuïri. Molecularment és la mateixa que la del banc de germoplasma d'El Encín.

### Usos i coneixements

Consum humà  
Vinya de vinificació

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Forta

#### Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

#### Pàmpol

Port	Erecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

#### Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

#### Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

#### Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Molt gran
Forma del limbe	Orbicular
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Fortament superposada
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Relació L/A de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Alta o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Mitjans
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

#### Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
---------------------------------------	---------

Densitat/Compacitat	Solta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Mitjana

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Mitjana
Forma de la baia	Globosa
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Tova o lleugerament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

### Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Primerenca

### Aptituds agronòmiques

Producció (kg)	2,33
Nombre de raïms	14,50
Pes del raïm (g)	155,44
Vigor	Mitjà

### Qualitat del raïm

Acidesa total	6,2
Alcohol potencial	12,3
Potencial aromàtic	Mitjà
Intensitat de coloració	Mitjana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca