



Descripció de la varietat

Varietat d'àmplia difusió; es troba arreu de Mallorca i també a Menorca. Antigament era la parra de raïm blanc que hi havia a totes les cases de camp.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de balança

Observacions

Autoritzada la seva plantació a les Illes Balears mitjançant el BIOB núm. 20 de 21/03/2002.

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent
Presència de pèls tombats a la punta	Densos
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Verd
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Densos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Llargs
-----------------------------	--------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Semisuperposada
Relació L/A de les dents	Mitjana
Longitud de les dents (cm)	Curta
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran
Densitat/Compacitat	Mitjana
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Llarga

Baia

Longitud de la baia (cm)	Gran
Forma de la baia	El·lipsoide estreta
Color de l'epidermis	Verd grogós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermeza de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca