



**Descripció de la varietat**

Varietat negra d'àmplia difusió, la més estesa a totes les cases de camp de Mallorca. Durant la primera meitat del segle XX era la varietat principal de Binissalem. També es feia servir com a raïm de vinificació.

**Usos i coneixements**

Consum humà  
Vinya de balança

**Caràcters morfològics de la varietat**

Sumitat/Pàmpol Jove	
Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Difusa
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Dèbil

Fulla jove	
Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Vermell rogenc clar
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol	
Port	Semirecte-horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells	
Longitud dels circells (cm)	Mitjans

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta	
Longitud del limbe (cm)	Gran
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament superposada
Longitud de les dents (cm)	Mitjana
Relació L/A de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Barreja de rectilínies i convexes
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Més curta

Raïm	
Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Gran

Densitat/Compacitat	Solta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Llarga

### Baia

Longitud de la baia (cm)	Gran
Forma de la baia	El·lipsoide estreta
Color de l'epidermis	Negre blavós
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Cap

### Fenologia

Època del desborrament	Primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca