



Descripció de la varietat

Es considera una de les varietats de taula més antigues de Mallorca. Està repartida arreu de l'illa de Mallorca.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de balança

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat	
Obertura de la punta	Completament oberta
Distribució de la pigmentació antociànica	Absent
Pèls tombats	Mitjans
Pigmentació antociànica dels pèls tombats	Absent o molt dèbil

Fulla jove	
Color del feix	Verd
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Mitjans
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol	
Port	Horitzontal
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd i vermell
Color de la cara dorsal del nus	Verd i vermell
Color de la cara ventral del nus	Verd i vermell

Circells	
Llargària	Mitjans

Fulla adulta	
Mida del limbe	Gran
Forma del limbe	Orbicular
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls al sinus peciolar	Lleugerament superposada
Llargària de les dents	Curta
Relació llargària/amplada de les dents	Mitjana
Forma de les dents	Ambdós costats convexos
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Escassos
Pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Escassos
Llargària del peciòl en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Flor	
Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Insecció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Raïm	
Mida del raïm	Gran
Compacitat	Solta

Llargària del peduncle del raïm principal	Mitjana
---	---------

Baia

Mida de la baia	Mitjana
Forma de la baia	El·lipsoide ampla
Color de l'epidermis	Vermell
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Moderadament ferma
Gust particular	Cap
Formació de llavors	Ben formades

Fenologia

Època del desborrament	Molt primerenca
Època de l'inici del verolat	Tardana