



Descripció de la varietat

Collida entre Cas Concos i Felanitx juntament amb la varietat callet negrella. Molt apreciada com a varietat de taula, però sensible a la botritis. Actualment en desús per la introducció de noves varietats.

Usos i coneixements

Consum humà
Vinya de balança

Caràcters morfològics de la varietat

Sumitat/Pàmpol Jove

Obertura de la punta	Completament oberta
Presència de pèls tombats a la punta	Escassos
Distribució de la pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Nota
Pigmentació antociànica dels pèls tombats a la punta	Absent o molt dèbil

Fulla jove

Color de l'anvers del limbe (4a fulla)	Vermell rogenc clar
Densitat pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absents o molt escassos
Intensitat de la pigmentació antociànica	Dèbil

Pàmpol

Port	Semiecte
Color de la cara dorsal de l'entrenús	Verd
Color de la cara ventral de l'entrenús	Verd
Color de la cara dorsal del nus	Verd
Color de la cara ventral del nus	Verd

Circells

Longitud dels circells (cm)	Mitjans
-----------------------------	---------

Flor

Òrgans sexuals	Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat
Inserció de la primera inflorescència	Tercer o quart nus
Nombre d'inflorescències per pàmpol	1,1 a 2 inflorescències

Fulla adulta

Longitud del limbe (cm)	Mitjana
Forma del limbe	Pentagonal
Nombre de lòbuls	Cinc
Posició dels lòbuls del sinus peciolar	Lleugerament oberta
Longitud de les dents (cm)	Llarga
Relació L/A de les dents	Gran
Forma de les dents	Ambdós costats rectilinis
Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica	Absent o molt baixa
Densitat de pèls tombats entre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Densitat de pèls drets sobre les nervadures principals del revers	Absent o molt escassos
Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central	Moderadament més curta

Raïm

Longitud del raïm sense peduncle (cm)	Mitjana
---------------------------------------	---------

Densitat/Compacitat	Solta
Longitud del peduncle del raïm principal (cm)	Llarga

Baia

Longitud de la baia (cm)	Gran
Forma de la baia	Obovoide
Color de l'epidermis	Rosa
Pigmentació antociànica de la polpa	Absent o molt dèbil
Fermesa de la polpa	Molt ferma
Formació de llavors	Ben formades
Gust particular	Moscatell

Fenologia

Època del desborrament	Mitjana
Època de l'inici del verolat	Tardana

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Llibres i altres monografies	Escalona, J.M.; Luna, J.M.; Bota, J.; Garau, C.; Martorell, A.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Publicacions electròniques	Escalona et al.	Varietats de vinya de les Illes Balears	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Publicacions electròniques	Calafat, P.	Vinyòvol. Vocabulari pagès de la vinya i el vi.	Documenta Balear