



Descripció de la varietat

La pruna de la sang, va ser citada com una varietat de pruna "grossa, vermella i de suc sanguinós" a l'entrada de Francesc Barceló, de la Gran Encyclopèdia de Mallorca (1989)*. La pruna de la sang que es conserva al reservori és mitjana i es caracteritza per la seva forma circular de color vermell a l'epidermis i una polpa de color vermell. L'inici de la floració és primerenca, al març, i la recol·lecció del fruit a finals del mes de juliol.

*Suau, T. ?Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes?. 2016.

Origen de la varietat

La pruna de la sang va ser citada com una de les varietats més comunes que es fan Mallorca (Augsburg, 1871)*.

*Suau, T. ?Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes?. 2016.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

| | |
|----------------------------|---------|
| Vigor | Mitjà |
| Port de la branca d'un any | Penjant |

Fulla

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Llargària del limbe | Mitjana ($7,63 \pm 0,81$) |
| Amplada del limbe | Estreta ($2,79 \pm 0,52$) |
| Relació llargària/amplada | Mitjana (1,87) |
| Forma del limbe | El·líptica |
| Forma de la base del limbe | Aguda |
| Llargària del pecíol | Mitjana ($1,68 \pm 0,33$) |
| Incisions a la vora del limbe | Serrades |
| Posició en relació a la branca | Ascendent |

Fruit

| | |
|--|-----------------------------|
| Mida (cm) | Mitjana ($4,27 \pm 0,23$) |
| Pes (g) | $41,79 \pm 6,26$ |
| Forma en vista lateral | Circular |
| Color del fons de l'epidermis (un cop treta la pruïna) | Vermell |
| Color de la polpa | Vermell |
| Adherència del pinyol a la polpa | Semiadherent |
| Forma del pinyol en vista lateral | El·líptica |
| Forma del pinyol en vista ventral | El·líptica ampla |

Fenologia

| | |
|--|-------------------------------------|
| Inici de la floració (10 % de flors obertes) | Primerenca (Segona setmana de març) |
| Inici de la maduresa | Precoç (Tercera setmana de juliol) |

Altres

| | |
|------------------------------|------------------|
| Contingut en sucres (° Brix) | $14,60 \pm 0,28$ |
| pH | $2,99 \pm 0,11$ |
| Acidesa (g àcid màlic/L) | $20,20 \pm 0,75$ |

Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors | Títol | Editorial |
|---------|--------|-------|-----------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--|--|
| Llibres i altres monografies | GEM | Gran enciclopèdia de Mallorca | . Promomallorca (25 volums) |
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | "Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca?. A: XXIV Jornada d'Antropònima i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística | Universitat de les Illes Balears |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |