



Descripció de la varietat

La cireres blanques ténen una fermesa molt consistent, mida gran, reniforme, amb l'epidermis vermella, la polpa de color crema i el peduncle de mida mitjana. És una varietat de floració tardana i maduració mitjana. A nivell genètic, destaca la seva diferenciació respecte a la resta de cirerers, excepte de la blanca de Montuïri. Això, ens fa pensar que té un origen diferent a la resta.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Port	Erecte
Ramificació	Dèbil

Fulla

Llargària del limbe	Mitjana (91,3 ± 8,24)
Amplada del limbe	Mitjana (56,13 ± 5,56)
Relació llargària/amplada	1,63
Llargària del pecíol	Llarga (36,6 ± 4,38)
Presència de nectaris	Presentes

Fruit

Mida (mm)	Gran (24,40 ± 0,83)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Mitjana (39,88 ± 4,77)
Color de l'epidermis	Vermell
Color de la polpa	Crema
Fermesa	Molt consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

Fenologia

Inici de la floració	Tardana (Segona setmana d'abril)
Maduració del fruit	Mitjana (Segona setmana de juny)

Altres

Contingut en sucre (° Brix)	22,20 ± 1,57
Pes (g)	7,79 ± 0,50

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Comunicació d'un congrés	Fornés, J.; Ordinas, A. [?][?]	"Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística	Universitat de les Illes Balears [?]
Informe	Staller Gränicher, M. A. [?]	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca