



### Descripció de la varietat

La cireres blanques ténen una fermesa molt consistent, mida gran, reniforme, amb l'epidermis vermella, la polpa de color crema i el peduncle de mida mitjana. És una varietat de floració tardana i maduració mitjana. A nivell genètic, destaca la seva diferenciació respecte a la resta de cirerers, excepte de la blanca de Montuïri. Això, ens fa pensar que té un origen diferent a la resta.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Arbre i ramificació

Port	Erecte
Ramificació	Dèbil

#### Fulla

Llargària del limbe	Mitjana (91,3 ± 8,24)
Amplada del limbe	Mitjana (56,13 ± 5,56)
Relació llargària/amplada	1,63
Llargària del pecíol	Llarga (36,6 ± 4,38)
Presència de nectaris	Presentes

#### Fruit

Mida (mm)	Gran (24,40 ± 0,83)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Mitjana (39,88 ± 4,77)
Color de l'epidermis	Vermell
Color de la polpa	Crema
Fermesa	Molt consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

#### Fenologia

Inici de la floració	Tardana (Segona setmana d'abril)
Maduració del fruit	Mitjana (Segona setmana de juny)

#### Altres

Contingut en sucre (° Brix)	22,20 ± 1,57
Pes (g)	7,79 ± 0,50

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Comunicació d'un congrés	Fornés, J.; Ordinas, A. [?][?]	"Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística	Universitat de les Illes Balears [?]
Informe	Staller Gränicher, M. A. [?]	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca