Bord de Planícia

Cirerer - *Prunus avium*



Descripció de la varietat

El cirerer bord de Planícia fa una cirera de mida mitjana, de fermesa consistent i reniforme. El seu color és negre a l?epidermis i la polpa de color vermell fosc amb el peduncle molt llarg. Presenta un contingut de sucres de 23,70 ± 2,17 °Brix. És un cirerer de floració mitjana i maduració primerenca. Des del punt de vista genètic, té un cert parentiu amb la cirera negrins, tot i que llunyà.

Origen de la varietat

Es va prospectar a Banyalbufar.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació	
Port	Estès
Ramificació	Dèbil

Fulla	
Llargària del limbe	Mitjana (83,87 ± 7,32)
Amplada del limbe	Estreta (51,67 ± 5,70)
Relació llargària/amplada	Petita (1,62)
Llargària del pecíol	Mitjana (33,00 ± 2,79)
Presència de nectaris	Presents

Fruit	
Mida (mm)	Mitjana (20,33 ± 0,58)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Llarga (43,92 ± 4,76)
Color de l'epidermis	Negre
Color de la polpa	Vermell fosc
Fermesa	Consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

Fenologia	
Inici de la floració	Mitjana (Quarta setmana de març)
Maduració del fruit	Primerenca (Primera setmana de juny)

Altres	
Contingut en sucre (º Brix)	23,70 ± 2,17
Pes (g)	4,80 ± 0,37

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Suau, T.?	Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe	Staller Gränicher, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca