



### Descripció de la varietat

El cirerer bord de Planícia fa una cirera de mida mitjana, de ferma consistent i reniforme. El seu color és negre a l'epidermis i la polpa de color vermell fosc amb el peduncle molt llarg. Presenta un contingut de sucres de  $23,70 \pm 2,17$  °Brix. És un cirerer de floració mitjana i maduració primerenca. Des del punt de vista genètic, té un cert parentiu amb la cirera negrins, tot i que llunyà.

### Origen de la varietat

Es va prospectar a Banyalbufar.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Arbre i ramificació

Port	Estès
Ramificació	Dèbil

#### Fulla

Llargària del limbe	Mitjana ( $83,87 \pm 7,32$ )
Amplada del limbe	Estreta ( $51,67 \pm 5,70$ )
Relació llargària/amplada	Petita (1,62)
Llargària del pecíol	Mitjana ( $33,00 \pm 2,79$ )
Presència de nectaris	Presentes

#### Fruit

Mida (mm)	Mitjana ( $20,33 \pm 0,58$ )
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Llarga ( $43,92 \pm 4,76$ )
Color de l'epidermis	Negre
Color de la polpa	Vermell fosc
Fermesa	Consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

#### Fenologia

Inici de la floració	Mitjana (Quarta setmana de març)
Maduració del fruit	Primerenca (Primera setmana de juny)

#### Altres

Contingut en sucre (° Brix)	$23,70 \pm 2,17$
Pes (g)	$4,80 \pm 0,37$

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Suau, T. [2]	Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Informe	Staller Gränicher, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca