



### Descripció de la varietat

L'arxiduc (Augsburg, 1871)\* cita la cirera comosa, sense més, com una varietat que es fa a Mallorca, una de les més preuades, i la primera que madura, al mes de maig, mentre que la resta ho fan successivament fins al mes d'agost. La cirera comosa grossa que es conserva al reservori, és també de maduració primerenca i fa una cirera de fermesa consistent i mida mitjana. És reniforme, amb l'epidermis de color vermell fosc, la polpa de color vermell mitjà i el peduncle llarg. Presenta un contingut de sucres de 20,40 °Brix. La informació de l'anàlisi genètica de la varietat la considera iguals que les varietats de gelosa de mèrlera, comosa, d'escata i de capellà, tot i que morfològicament, aquestes dues últimes són diferents.

\*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. 2016.

### Origen de la varietat

Augsburg (1871)\* ja la citava com una de les varietats que es feien a Mallorca.

\*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears:albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. 2016.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Arbre i ramificació

|             |       |
|-------------|-------|
| Port        | Estès |
| Ramificació | Forta |

#### Fulla

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Llargària del limbe       | Mitjana (92,47 ± 8,68) |
| Amplada del limbe         | Ampla (62,47 ± 4,32)   |
| Relació llargària/amplada | Gran (1,48)            |
| Llargària del pecíol      | Llarga (39,00 ± 3,81)  |
| Presència de nectaris     | Presents               |

#### Fruit

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Mida (mm)                           | Mitjana (20,97 ± 0,93) |
| Forma                               | Reniforme              |
| Llargària del peduncle (mm)         | Llarga (42,20 ± 5,11)  |
| Color de l'epidermis                | Vermell obscur         |
| Color de la polpa                   | Vermell mitjà          |
| Fermesa                             | Consistent             |
| Forma de la llavor en vista ventral | El·líptica mitjana     |

#### Fenologia

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Inici de la floració | Mitjana (Quarta setmana de març)    |
| Maduració del fruit  | Primerenca (Quarta setmana de maig) |

#### Altres

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Contingut en sucre (° Brix) | 20,40 ± 1,41 |
| Pes (g)                     | 5,46 ± 0,59  |

### Acreditació bibliogràfica

| Objecte | Autors   | Títol  | Editorial  |
|---------|----------|--|--|
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |

|                             |                                    |   |   |
|-----------------------------|------------------------------------|---|---|
| Informe                     | Staller<br>Grànicher, M.<br>A. [?] | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016   | Conselleria de Medi Ambient,<br>Agricultura i Pesca |
| Comunicació<br>d'un congrés | Fornés, J;<br>Ordinas, A. [?]      | "Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca?. A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística | Universitat de les Illes Balears [?]                |