



Descripció de la varietat

El cirerer de gelosa de mèrlera fa una cirera de fermesa i mida mitjana, reniforme, amb l'epidermis vermella fosc, la polpa de color vermell mitjà amb el peduncle curt. Presenta un contingut de sucres de 20,44 °Brix. És una varietat de floració i maduració primerenca. L'anàlisi genètica de la varietat la va considerar com a sinonímia de comosa i comosa grossa. També d'escata i de capellà, si bé, aquestes dues darreres, presenten caràcters morfològics notablement diferents.

Usos i coneixements

Consum humà

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Port	Estès
Ramificació	Mitjana

Fulla

Llargària del limbe	Llarga (117,67 ± 7,38)
Amplada del limbe	Mitjana (60,33 ± 5,11)
Relació llargària/amplada	Petita (1,95)
Llargària del pecíol	Mitjana (31,42 ± 4,05)
Presència de nectaris	Presentes

Fruit

Mida (mm)	Mitjana (21,61 ± 0,79)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Curta (33,525 ± 3,81)
Color de l'epidermis	Vermell obscur
Color de la polpa	Vermell mitjà
Fermesa	Mitjana
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

Fenologia

Inici de la floració	Primerenca (Segona setmana de Març)
Maduració del fruit	Primerenca (Tercera setmana de maig)

Altres

Contingut en sucre (° Brix)	20,44 ± 1,42
Pes (g)	5,54 ± 0,50

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Staller Gränicher, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Llibres i altres monografies	Augsburg, A Ll. S.	Die Balearen. Tom III.	Traducció del volum III, Primera Part, de Die Balearen (Arxiduc Lluís Salvador, 1871), Sa Nostra, Caixa de Balears, Palma, 1987.