



Descripció de la varietat

El cirerer està referenciat com Porreres 2, perquè és el municipi on es va prospectar. Els resultats dels marcadors moleculars indiquen un fort parentesc amb el cirerer de s'aranyó, i llunyana de l'altra varietat prospectada a Porreres (Porreres 1). La seva cirera és de fermesa consistent i mida mitjana, reniforme, amb l'epidermis de color vermell, la polpa de color rosa amb el peduncle curt. És una varietat de maduració primerenca.

Origen de la varietat

La denominació és moderna, perquè com el seu nom indica, s'ha prospectat els darrers anys, a la zona de Porreres, el que li ha donat el nom. Se'n troben alguns exemplars al reservori de cirerer de Can Montserrat.

Caràcters morfològics de la varietat

Arbre i ramificació

Port	Estès
Ramificació	Mitjana

Fulla

Llargària del limbe	Mitjana (92,00 ± 4,95)
Amplada del limbe	Ampla (63,00 ± 3,01)
Relació llargària/amplada	Gran (1,46)
Llargària del pecíol	Llarga (40,47 ± 3,16)
Presència de nectaris	Absents

Fruit

Mida (mm)	Mitjana (21,09 ± 1,01)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Curta (34,67 ± 4,68)
Color de l'epidermis	Vermell
Color de la polpa	Rosa
Fermesa	Consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

Fenologia

Inici de la floració	Mitjana (Tercera setmana de març)
Maduració del fruit	Primerenca (Quarta setmana de maig)

Altres

Contingut en sucre (° Brix)	20,28 ± 0,47
Pes (g)	5,21 ± 0,60

Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Staller, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca