



### Descripció de la varietat

El cirerer primerenc de Sóller fa una cirera mitjana, de fermesa molt consistent, de forma reniforme, amb l'epidermis de color vermell fosc, la polpa de color vermell mitjà i el peduncle molt llarg. L'estudi genètic d'aquesta varietat, va demostrar una proximitat respecte el primerenc d'abril. És una varietat de floració i maduració primerenca.

### Origen de la varietat

Es va prospectar al municipi de Sóller i se'n conserven alguns exemplars a la finca de Can Montserrat.

### Usos i coneixements

Consum humà

### Caràcters morfològics de la varietat

#### Arbre i ramificació

Port	Erecte
Ramificació	Dèbil

#### Fulla

Llargària del limbe	Curta (74,40 ± 26,83)
Amplada del limbe	Mitjana (54,27 ± 5,00)
Relació llargària/amplada	Gran (1,37)
Llargària del pecíol	Llarga (38,33 ± 4,35)
Presència de nectaris	Presentes

#### Fruit

Mida (mm)	Mitjana (19,68 ± 1,79)
Forma	Reniforme
Llargària del peduncle (mm)	Molt llarga (54,45 ± 5,79)
Color de l'epidermis	Vermell obscur
Color de la polpa	Vermell mitjà
Fermesa	Molt consistent
Forma de la llavor en vista ventral	El·líptica ampla

#### Fenologia

Inici de la floració	Primerenca (Segona setmana de Març)
Maduració del fruit	Molt primerenca (Segona setmana d'abril)

#### Altres

Contingut en sucre (° Brix)	19,16 ± 2,31
Pes (g)	4,08 ± 1,09

### Acreditació bibliogràfica

Objecte	Autors	Títol	Editorial
Informe	Staller, M. A.	Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016	Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca